

PROGRAM SZCZEPIEŃ ZALECANYCH SZPZOZ w Jabłonce

Wskazane szczepienia:

Dla niemowląt [<1 r.ż.]

- przeciw meningokokom grupy B - szczepionką Bexsero. Należy podać 2 dawki w odstępie 2 miesięcy oraz dawkę przypominającą w 2 r.ż.
- przeciw meningokokom z grup A, C, W i Y – szczepionką Nimenrix
- przeciw grypie [szczepienie po ukończeniu 6 m-ca życia]

W celu ograniczenia występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, złagodzenia bólu u dzieci wskazane jest podawanie szczepionek skojarzonych [6w1 lub 5w1]

Dla dzieci w wieku 1-2 lata:

- przeciw meningokokom grupy B – szczepionką Bexsero. Należy podać 2 dawki w odstępie 2 miesięcy oraz dawkę przypominającą po 12 miesiącach
- przeciw meningokokom z grup A, C, W i Y – szczepionką Nimenrix
- przeciw grypie - corocznie
- przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
- przeciw WZW typu A
- przeciw ospie wietrznej (dzieci uczęszczające do żłobka lub klubu malucha szczepione są nieodpłatnie)

Dla dzieci w wieku przedszkolnym [2-5 lat]

- przeciw meningokokom grupy B – szczepionką Bexsero. Należy podać 2 dawki w odstępie 1-2 miesięcy
- przeciw meningokokom z grup A, C, W i Y – szczepionką Nimenrix
- przeciw grypie - corocznie
- przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
- przeciw WZW typu A
- przeciw ospie wietrznej

Dzieci w wieku szkolnym [7-18 lat]

- przeciw meningokokom grupy B – szczepionką Bexsero. Należy podać 2 dawki w odstępie 1-2 miesięcy

- przeciw meningokokom z grup A, C, W i Y – szczepionką Nimenrix
- przeciw grypie - corocznie
- przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
- przeciw WZW typu A
- przeciw ospie wietrznej dzieci, które dotychczas nie chorowały
- przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) po 9 r.ż.

Dorośli:

- przeciw grypie - corocznie
- przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
- przeciw WZW typu B (dotychczas nieszczepieni)
- przeciw ospie wietrznej (dotychczas niechorujący)
- przeciw błonicy i tężcowi - co 10 lat

Seniorzy [>65rż]:

- przeciw grypie (corocznie)
- przeciw pneumokokom

Szczególne grupy pacjentów:

Kobiety w ciąży:

- przeciw grypie- w dowolnym okresie ciąży, szczególnie 2-3 trymestr
- przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi (Tdap) 27-36 tydzień ciąży

Kobieta poddając się szczepieniu w ciąży chroni nie tylko siebie, ale również noworodka przed ryzykiem związanym z zakażeniem i hospitalizacją.

Pacjenci po usunięciu śledziona, z zespołami chorobowymi powodującymi upośledzenie odporności, poddawani leczeniu immunosupresyjnemu (w okresie remisji):

- przeciw pneumokokom
- przeciw meningokokom A,C,W, Y, B
- przeciw grypie
- przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi
- przeciw WZW typu A i B